

Die cremige Therapie bei Vaginalmykosen

Vagisan Myko Kombi 3 Tage

Drei Tage anwenden:
je 1 Vaginalzäpfchen und Creme



Vagisan Myko Kombi

1 Tag Vaginalzäpfchen,
1 Woche Creme



Cremebildung nach 30 Minuten

Cremige Zäpfchen statt trockener Tabletten

- schmilzt vollständig, ohne Rückstände
- angenehmes Einführen, ohne Applikator
- Kombination aus Zäpfchen & Creme

Vagisan Myko Kombi bzw. Vagisan Myko Kombi 3 Tage

Wirkstoff: Clotrimazol. Zusammensetzung: 1 Vaginalz. enth. als Wirkstoff 500 mg Clotrimazol (Vagisan Myko Kombi) bzw. 200 mg Clotrimazol (Vagisan Myko Kombi 3 Tage); sonstige Bestandteile: Cetylstearylalkohol, Hartfett, Macrogol-20-glycerolmo-nostearat, Polyacrylsäure-Natriumsalz. 1 g Creme enth. als Wirkstoff 10 mg Clotrimazol (Vagisan Myko Kombi) bzw. 20 mg Clotrimazol (Vagisan Myko Kombi 3 Tage); sonstige **Bestandteile:** Benzylalkohol, Cetylpalmitat, Cetylstearylalkohol, Natriumcitrat, Octyldodecanol, Polysorbat 60, Sorbitanstearat, ger. Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hefepilzinfektionen der Scheide und des äußeren Genitalbereichs (meist durch *Candida albicans*). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Clotrimazol oder einen der sonstigen Bestandteile. Frühschwangerschaft. **Nebenwirkungen:** Häufig: Brennen und Juckreiz an der behandelten Stelle. Gelegentlich: Hautirritationen (z. B. brennendes Gefühl, Stechen oder vorübergehende Rötung). Sehr selten: Allergische Reaktionen (z. B. Juckreiz, Erythem, Atemnot, behandlungsbedürftiger Blutdruckabfall bis hin zu Bewusstseinsstörungen, Übelkeit, Diarrhö). **Stand:** 03/2020. Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel · 33532 Bielefeld · www.vagisan.de

DR. WOLFF

... und bei wiederholten vaginalen Infektionen:



Keine
Kühlschrankspeicherung
erforderlich

Vagisan Milchsäure-Bakterien

- Vaginalkapseln zum **Wiederaufbau der Vaginalflora**
- nach Antibiotika, vaginalen Antiseptika
- zur **Vorbeugung und Nachbehandlung** von Scheidenpilz
- bei rezidivierenden Harnwegsinfekten (prophylaktisch in der Prophylaxe)
- mit zwei patentierten Laktobazillen-Stämmen: *Lactobacillus gasseri* EB01™ (H_2O_2 -Bildner) und *Lactobacillus rhamnosus* PB01™

Dosierungsvorschläge*

- 1 Vaginalkapsel abends über 8 –10 Tage
- ggf. Anwendungszyklus jeweils post-menstruell wiederholen

Vagisan Biotin-Lacto

- zur Gesunderhaltung der Vaginalschleimhäute
- Einnahme z. B. nach Antibiotikabehandlungen



Keine
Kühlschrankspeicherung
erforderlich

Vagisan Biotin-Lacto ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform, mit **oral einzunehmenden Biotin und Milchsäure-Bakterien** (*Lactobacillus reuteri*, RC-14®, *Lactobacillus rhamnosus*, GR-1®**). Die Einnahme von **einer Kapsel täglich über 30 Tage** mit einem Glas Wasser kann u. a. in Zeiten von besonderer Belastung sinnvoll sein, z. B. bei Einnahme bestimmter Medikamente (wie Antibiotika), negativem Stress oder in der Schwangerschaft.

Vagisan Milchsäure-Bakterien: Medizinprodukt. **Vagisan Biotin-Lacto:** Nahrungsergänzungsmittel

* Dosierungsvorschläge und Anwendungsschema (mod.) nach Prof. Dr. med. W. Mendling (Frauenarzt 2010; 51:446–453)

** RC-14® und GR-1® sind eingetragene Warenzeichen von Chr. Hansen A/S